



I
Mini wylęgarka na 4 jajka



Wyświetlacz, menu, panel sterowania



Nalej wodę do wodnych kanałów,
włącz wylęgarkę



Zestaw zawiera:

1x wylęgarka

1x kabel do zasilania



Połączenie elektryczne

Instrukcja obsługi

Przyciski

- A. Naciśnij przycisk, aby włączyć wylęgarnię, a urządzenie przełączy się w tryb ustawiania temperatury. Naciśnij przycisk + lub -, aby ustawić wartości temperatury. Naciśnij dwukrotnie przycisk Setup, aby wyjść z trybu konfiguracji.

- B. Naciśnij przycisk „+”, aby zwiększyć wybrane wartości
- C. Naciśnij przycisk „-”, aby zmniejszyć wybrane wartości

Opis

.Jeśli wylęgarnia jest zapalona, znajduje się w trybie roboczym. „B” Gdy świeci się wskaźnik „B”, wylęgarnia działa i podgrzewa jajka. „SET” świeci się, gdy lampka SET znajduje się w trybie ustawiania temperatury.

Instrukcja

1. Włącz wylęgarnię za pomocą akumulatora AC220V / 110 V. Przejdź do trybu pracy, w którym świeci wskaźnik „WORK”
2. Przed użyciem uzupełnij wystarczającą ilością wody.
3. Rozgrzej wylęgarnię przez 10-20 minut przed umieszczeniem jaj. Sprawdź, czy kontroler jest ustawiony na 38 ° C.
4. Sprawdź, czy oba wskaźniki świecą się podczas procesu podgrzewania.
5. Odłącz urządzenie po zakończeniu procesu podgrzewania. Umieść zbiornik na wodę pod tacą na jajka i umieść zapłodnione jaja w wylęgarni.
6. Zakryj wylęgarnię i włącz ją ponownie.

Uwaga

Odłącz wylęgarnię za każdym razem, gdy pokrywa zostanie zdjęta.

Uzupełniaj regularnie wodą, każdy drugi dzień.

Jaja wylęgowe muszą zostać zapłodnione, aby umożliwić wylęgu kurcząt.

PRZED PIERWSZĄ INKUBACJĄ

Aby uzyskać najlepsze wyniki kreskowania, przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję.

1. Sprawdź, czy inkubator działa prawidłowo. 2. Dolej wodę w zależności od wilgotności otoczenia 3. Ułóż jajka z czubkiem w dół. 4. Zamknij pokrywkę i włącz wylęgarnię 5. Monitoruj wilgotność w wylęgarni i w razie potrzeby uzupełnij wodą
6. Jednocześnie ważne jest wypełnienie kanałów wodnych wodą, aby osiągnąć maksymalną wilgotność. (Ten krok to ważne jest, aby skorupki jaj były wystarczająco miękkie, a dzioby były łatwe przerwy.) 7. W ostatnich dniach otwórz pokrywkę tylko, aby dodać wodę. Poczekać, aż kurczaki się wyklują. Utrata temperatury i wilgotność spowodują, że skorupy wyschną, a kurczaki nie będą mogły ich wydrążyć.

WZKAZÓWKI DOTYCZĄCE INKUBATORÓW

1. Higiena jaj i inkubatorów

Właściwa higiena jest niezbędna do osiągnięcia dobrych wyników wylęgu. Zaniedbanie higieny może powodować śmierć piskląt w ciągu pierwszych 10 dni życia.

Do inkubacji używaj wyłącznie czystych jaj. Zanieczyszczone jaja są potencjalnymi nosicielami różnych chorób, które mnożą się w idealnych warunkach temperatury i wilgotności wylęgarki. Jeśli potrzebujesz inkubować brudne jajka, najpierw zaleca się umycie je ciepłą wodą (44–49 ° C) i zdezynfekowanie. Możesz w tym celu użyć klasycznych domowych środków dezynfekujących, a następnie osuszyć je papierowym ręcznikiem. Nie myj jaj w zimnej wodzie, aby bakterie nie dostały się do skorupy, ale także pamiętaj utrzymuj kontakt z wodą poniżej 4 minut, aby uniknąć uszkodzenia jaj.

2. ZDROWE ODŻYWIANIE

Bardzo ważne jest aby jaja były pobrane tylko i wyłącznie od zdrowych kandydatów ponieważ niektóre choroby mogą być przenośne przez jajko. Najczęstsze choroby przenoszone przez jaja to salmonella i Mycoplasma gallisepticum. Niedobory żywieniowe, takie jak niedobór ryboflawiny, są głównymi przyczynami zarodkowymi śmiertelność podczas środkowej fazy inkubacji (tj. między 12 a 14 dniem). Dieta hodowlana powinna rozpocząć się na sześć do ośmiu tygodni przed zebraniem jaj wylęgowych. Szczególny nacisk kładziony jest na witaminę A, D3, ryboflawinę, kwas pantotenowy, biotynę, kwas liści, witamina B12 i mineralny mangan

WZKAZÓWKI DOTYCZĄCE WYLEGARKI

1. Zapłodnione jaja należy zebrać jak najszybciej po zniesieniu. Idealna temperatura przechowywania to 10-15° C. Nie używamy jaj starszych niż 7 dni do wylęgu. Jajko jest zasadniczo pokryte warstwą proszku nie myć jaj przed przechowywaniem, aby uniknąć pozbawienia go tej warstwy ochronnej.

2. Skorupa jajek nie może być zdeformowana ani pęknięta.

3. Bardzo ostrożnie zdezynfekuj jajaka

4. Umieszczając jaja w wylęgarni, upewnij się, że są włożone czubkiem w dół.

5. Dodawaj wodę co drugi dzień, wysychanie wody zależy od temperatury otoczenia.

6. Kontrola zapłodnionych jaj:

5-6 dzień wybierz nie zapłodnione i nie żyjące jajka

11-12 dzień kontrola rozwoju zarodka. Są dobrze rozwinięte zarodki, naczynia krwionośne i komora powietrza duże i ostro określone

16-17 dni - Zdrowy zarodek wypełnia całe jajko, więc większość miejsc jest ciemna. Jeśli zarodek nie żyje, krew w naczyniu w jaju są rozmyte, komora powietrzna i granica między jajkiem a komorą powietrzną są niejasne i nieograniczone.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

1. Jak przechowywać jajka?

Złożone jaja należy pozostawić w chłodnym miejscu na 24 godziny, aby utrzymał się pęcherzyk powietrza w jajku a był stabilizowany. Jajka zawsze przechowuj z końcówką skierowaną w dół.

2. Kiedy poznam, że moja wylęgarka jest przygotowana do pracy?

Przed ułożeniem jaj do wylęgarki pozostaw ją włączoną na co najmniej 24 godziny w celu kontroli prawidłowego funkcjonowania urządzenia. Najprostrzym sposobem jak zniszczyć jaja wylęgowe jest złe ustawienie wylęgarki.

3. Jaką ustawić idealną temperaturę wylęgarki?

Odpowiedź jest bardzo prosta, niezbędna do prawidłowego wykluć jest temperatura w wylęgarni 37,5 ° C / wilgotność ustawiona na 55% w ciągu pierwszych 18 dni, / 60-65% w ciągu ostatnich 3 dni przed wykluć.

4. Czy mój termometr jest dokładny?

Utrzymanie odpowiedniej temperatury w wylęgarni jest częstym problemem ale dzięki częstemu wykluwaniu się piskląt można wylepszyć niedokonałości w zakresie temperatury. Jeżeli jaja wykluwają się wcześniej niż by miały musisz obniżyć temperaturę, a w przypadku jeśli zauważysz powolniejszy rozwój tak temperaturę należy zwiększyć.

5. Bardzo ważna informacja na temat wilgotności wylęgarki?

Wraz ze zmianą pory roku zmienia się i wilgotność otoczenia. Jeśli inkubujesz jaja w styczniu lub lutym będzie dla Ciebie bardzo trudnym zadaniem utrzymać odpowiednią wilgotność, dlatego że wilgotność otoczenia jest znacząco niska. I odwrotnie, jeżeli inkubujesz jaja w czerwcu lub w lipcu to wilgotność zewnętrzna jest zwykle znacznie wyższa niż w wylęgarni.

6. Jak długo trwa wykluć się piskląt?

Okres inkubacji jaj drobiowych trwa 21 dni. Jaja powinny być obracane przynajmniej pierwszych 18 dni trzy razy dziennie. W następnych dniach jaja już nie obracaj. Otwieraj wylęgarnię co najmniej to będzie możliwe najlepiej jedynie w przypadku dolania wody i utrzymaniu dzięki temu wilgotności. Zwiększenie wilgotności w ostatnich dniach znacznie pomoże w wykluć się piskląt.